

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- ثانوية تواتي حمد لخضر
- متقن ميلودي العروسي
- مدرسة سبل النجاح
دورة : ماي 2017
المدة : 03 سا

وزارة التربية الوطنية
امتحان بكالوريا تجريبي التعليم الثانوي
الشعبة : علوم تجريبية
اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (4.5 نقطة)

- الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ نعتبر النقطتين $A(1, 0, -1)$ ، $B(\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2})$
- نعتبر (s) المعادلة لسطح الكرة المعرفة بـ : $x^2 + y^2 + z^2 - 3x + 2y + z + 2 = 0$
- المستوي (p) ذا المعادلة $x - 2y + z - 3 = 0$
- أختر الإجابة الصحيحة الوحيدة لكل سؤال مع تبرير اختيارك :
- (1) الكرة (s) التي مركزها B طول قطرها هو : أ - $\sqrt{6}$ ، ب - $\sqrt{3}$ ، ج - $\sqrt{2}$
 - (2) المستوي (p) يقطع الكرة (s) في دائرة مركزها وطول قطرها هو :
أ - $\{A, \sqrt{6}\}$ ، ب - $\{B, \sqrt{6}\}$ ، أ - $\{B, \sqrt{3}\}$
 - (3) التمثيل الوسيطى للمستقيم الذي يشمل A و العمودي على المستوي (p) في B هو :
أ - $\begin{cases} x = t - 1 \\ y = -2t \\ z = t - 1 \end{cases}$ ، ب - $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t \\ z = t - 1 \end{cases}$ ، ج - $\begin{cases} x = t + 2 \\ y = -2t - 2 \\ z = t \end{cases}$ (t عدد حقيقي)
 - (4) المعادلة الديكارتية للمستوي (Q) الموازي لـ (p) ويحقق $d(A, Q) = d(A, p)$ هي :
أ - $x - 2y + z + 3 = 0$ ، ب - $x - 2y + z + 2 = 0$ ، ج - $2x - 2y + 2z - 3 = 0$
 - (5) لسطح الكرة (s) عند النقطة A :
أ - مستو وحيدا مماسا ، ب - عدة مستويات مماسه ، ج - لا يوجد أي مستو مماس

التمرين الثاني: (4.5 نقطة)

- نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلتين ذات المجهول Z حيث:
- (1) $Z^3 - 2Z^2 + 5Z = 0$
 - (2) $Z^3 + Z^2 + 4Z + 4 = 0$
- I - 1 - بين إذا كان Z_0 حلا للمعادلة (1) فإن $(Z_0 - 1)$ حلا للمعادلة (2).
2 - حل في \mathbb{C} المعادلة (1) ثم استنتج حلول المعادلة (2).
- II المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\vec{o}; \vec{u}; \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C ذات اللواحق على الترتيب : $Z_A = -1$ ، $Z_B = 1 + 2i$ ، $Z_C = 1 - 2i$
- 1 - أكتب على الشكل الأسى العدد المركب $\frac{Z_B - Z_A}{Z_C - Z_A}$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC
 - 2 - استنتج تحويلا T في المستوي المركب يحول C إلى B والنقطة A إلى نفسها مع ذكر عناصره المميزة
 - 3 - عين لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABC
 - 4 - h التحويل النقطي في المستوي الذي يحول كل نقطة $M(Z)$ من المستوي إلى النقطة $\hat{M}(\hat{Z})$

$$\vec{MM} = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$$

$$\vec{GM} = 4 \vec{GM}$$

أ) أثبت أن : $\vec{GM} = 4 \vec{GM}$
ب) أكتب الصيغة المركبة للتحويل h وحدد طبيعته مع ذكر عناصره المميزة

5- أ) التحويل S المعروف بـ: $S = T \circ h$ هو تشابه مباشر يطلب نسبته وزاويته .

ب) أحسب مساحة المثلث $\hat{A}\hat{B}\hat{C}$ صورة المثلث ABC بالتحويل S

التمرين الثالث : (4.5 نقطة)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} بـ: $u_0 = 2$ ومن أجل كل n من \mathbb{N} : $u_{n+1} = \frac{2}{3} u_n + \frac{1}{3} n + 1$

1 - أ) أحسب الحدود u_1, u_2, u_3

ب) ضع تخميناً حول اتجاه تغيرات (u_n)

2 - أ) برهن بالتراجع ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_n < n + 3$

ب) أدرس اتجاه تغيرات المتتالية (u_n)

3 - لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = u_n - n$

أ) برهن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0

ب) أكتب v_n بدلالة n ثم أستنتج u_n بدلالة n

ج) هل المتتالية (u_n) متقاربة.

4 - نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n + 2v_n$

بين أن : $S_n = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + 6$

التمرين الرابع : (6.5 نقطة)

لتكن الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = x + \frac{1-2e^{2x}}{1+2e^{2x}}$

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 - أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي فالدالة تكتب على الشكلين التاليين:

$$f(x) = x - 1 + \frac{2}{1+2e^{2x}}, \quad f(x) = x + 1 - \frac{4e^{2x}}{1+2e^{2x}}$$

ب) اختر الشكل المناسب لحساب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$ ثم استنتج وجود مستقيمين مقاربين مائلين (Δ) و (Δ')

لـ (C_f) يطلب إيجاد معادلتيهما

ج) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) و (Δ') .

2 - أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = (f(x) - x)^2$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

ج) استنتج وجود نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

3 - بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $\alpha \in]0.5; 1[$

4 - ثم أنشئ (C_f)

5- ناقش بياناً عدد وإشارة حلول المعادلة ذات الوسيط الحقيقي m : $m = \frac{1-2e^{2x}}{1+2e^{2x}}$ حيث $|m| < 1$

6- بين أن مساحة الحيز المحدد بالبيان (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

$$\ln\left(\frac{3}{2e^{-2}+1}\right) : \text{هي } y = x + 1 \text{ و } x = -1, x = 0$$

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(-7; 0; 4)$ ، $B(2; 1; 3)$ ، $C(3; 2; 4)$ ، $D(-3; -6; 6)$ والمستوي (p) معادلته $2x - 3y + z - 4 = 0$

1- تحقق أن النقطتين B و C من المستوي (p)

2- بين (p) هو المستوي المحوري للقطعة $[AD]$

3- أكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (AD)

4- تحقق أن النقطة $H(-5; -3; 5)$ هي نقطة تقاطع المستقيم (AD) والمستوي (p)

5- علماً أن حجم الرباعي $ABCH$ هو 10 (وحدة حجوم) استنتج مساحة المثلث BCH

6- (أ) بين أن التمثيل الوسيطي للمستوي (p) معرف بـ : $\begin{cases} x = \alpha + 7\lambda + 2 \\ y = \alpha + 4\lambda \\ z = \alpha - 2\lambda \end{cases}$ و α و λ عددين حقيقيين

(ب) لتكن M نقطة كيفية من المستوي (p) ، أثبت أن الجداء $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AD}$ مستقل عن الوسيطين α و λ

(ج) عين قيمتي α و λ بحيث تكون المسافة AM أصغر ما يمكن ثم استنتج هذه المسافة

التمرين الثاني: (5 نقاط)

(I) نعتبر في المجموعة C المعادلة : $Z^4 = -64$ (E)

1) بين أنه إذا كان Z_0 حلاً للمعادلة (E) فإن Z_0 و $\overline{Z_0}$ هما أيضاً حلان لها

نعتبر العدد المركب $Z_0 = i2 + 2$

أ- أكتب Z_0 على الشكل الأسّي

ب- تحقق أن Z_0 حل للمعادلة (E) ثم استنتج ثلاثة حلول أخرى لهذه المعادلة

(II) المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) ، نعتبر النقط: A, B, C, D ذات اللواحق

$$Z_D = \overline{Z_C} \text{ و } Z_C = -Z_A, \quad Z_B = \overline{Z_A}, \quad Z_A = i2 + 2$$

1) أ- بين أن النقط A, B, C, D تنتمي إلى دائرة واحدة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها .

طبيعة المثلث ABC .

2) ليكن R الدوران الذي مركزه O و يحول A إلى B

أ- عين زاوية الدوران R ثم أكتب عبارته المركبة .

ب- بين أن صورة الرباعي $ABCD$ بالدوران R هو نفسه , ثم استنتج طبيعته

3) أ- تحقق أن O هي مركز الرباعي $ABCD$

ب- عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة Z و التي تحقق : $\|\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA}\| = 4$

التمرين الثالث: (4 نقاط)

لتكن المتتالية (u_n) معرفة كما يلي : $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 1 - \frac{4}{u_n + 3}$

1- برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $-1 < u_n \leq 0$

2- ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتج تقاربها

3- نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة في \mathbb{N} كما يلي : $v_n = \frac{1}{u_n + 1}$

أ- بين أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها r و وحدها الأول v_0

ب- احسب v_n و u_n بدلالة n

ج- احسب $\lim u_n$

4- أ) نعتبر المجموعين : $s_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $\hat{s}_n = v_0 u_0 + v_1 u_1 + \dots + v_n u_n$

بين أن : $\hat{s}_n = n + 1 - s_n$ ثم عين قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون $\hat{s}_n = -60$

التمرين الرابع : (6.5 نقطة)

| | |
|---------|-------------|
| x | $+\infty$ 0 |
| $g'(x)$ | - |
| $g(x)$ | |

I - g دالة معرفة على $]0, +\infty[$ ب: $g(x) = \frac{x+1}{2x+1} - \ln x$

إليك جدول تغيراتها المبين في الشكل التالي

1- أكمل الجدول

2- علل وجود عدد حقيقي وحيد α على المجال $]0, +\infty[$ بحيث $g(\alpha) = 0$ ثم تحقق أن : $1.83 < \alpha < 1.84$

3- حدّد إشارة $g(x)$ على المجال $]0, +\infty[$.

II - f دالة المعرفة على $]0, +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{2 \ln x}{x^2 + x}$

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1- بين أن (C_f) يقبل محوري الإحداثيات مستقيمين مقاربين له

2- أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$: $f'(x) = \frac{4x+2}{(x^2+x)^2} \times g(x)$

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f . ثم شكل جدول تغيراتها

3- بين أن $f(\alpha) = \frac{2}{\alpha(2\alpha+1)}$ ثم استنتج حصرا $f(\alpha)$

4- أدرس وضعيه المنحنى (C_f) مع محور الفواصل

5- أنشئ (C_f)

6- عين قيم العدد الحقيقي الموجب تماما m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = f(m)$ حلا واحدا في المجال $]0, +\infty[$

7- نعتبر الدالة h المعرفة على $]0, +\infty[$ كما يلي : $h(x) = |f(x)|$

أ- أدرس قابلية اشتقاق الدالة h عند العدد 1

ب- اشرح كيفية إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f) ثم أنشئ (C_h) .