

التمرين الأول(04 ن):

I. تعتبر المستوى المركب المنسوب الى المعلم المتعامد المتجانس $(j, i, 0)$, فيما يلي اختار الاجابة الصحيحة في كل حالة مع التعليل.

(1) حل المعادلة $2i = 5 - 4i$ هو :

(2) اذا كان $\frac{5\pi}{6}$ عدمة z فان عدمة العدد المركب $\frac{i}{z^2}$ هي :

(3) ABC لواحقها على الترتيب المثلث $z_C = 1 + \sqrt{3} - i$; $z_B = 1 - 2i$; $z_A = 1 + 2i$ ، المثلث A قائم في A ب) متساوي الساقين في A ج) متقارن الاضلاع.

(4) مجموعة النقط M من المستوى المركب ذات اللحقة $z = 1 - 2i + e^{i\theta}$ حيث $\theta \in \mathbb{R}$ و B

نقطتان لاحقتهما على الترتيب $z_A = 1 - 2i$ و $z_B = -1 + 2i$

(أ) هي دائرة مركزها A و نصف قطرها 1 (ب) هي دائرة مركزها B و نصف قطرها 1

(ج) هي نصف مستقيم $[AM]$

التمرين الثاني(04 ن):

يحتوي الكيس A و B على كريات لا نفرق بينهما عند اللمس حيث نجد في الكيس A : 3 كريات بيضاء و 4 كريات حمراء و كريتان خضراء، بينما في الكيس B نجد 5 كريات بيضاء و 4 كريات حمراء و 3 كريات خضراء.

I. تجربة 1 : يسحب اللاعب عشوائياً 3 كريات في آن واحد في الكيس B

(1) احسب احتمال كل من الحوادث التالية :

V : من بين الكريات الثلاث المنسوبة توجد كرية خضراء واحدة فقط

M : الكريات المنسوبة الثلاث من نفس اللون .

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط بكل مخرج بعدد الالوان في المخرج.

أ) حدد القيم التي يأخذها X .

ب) حدد قانون احتمال للمتغير العشوائي X .

ج) احسب كل من الامل الرياضي، التباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي X .

II. تجربة 2 : يرمي اللاعب زهرة نرد غير مزيف و مرقطة من 1 الى 6، اذا تحصل على رقم مضاعف لـ 3 {3; 6} .

يسحب اللاعب كرية واحدة في الكيس A ، اما اذا تحصل على رقم آخر فيسحب كرية واحدة في الكيس B

(1) شكل شجرة الاحتمالات للتجربة 2.

(2) احسب احتمال الحصول على كرية حمراء واستنتاج احتمال الحصول على كرية بيضاء او خضراء.

لتكن الدالة f المعرفة على : $I = \left[\frac{1}{2}; +\infty \right]$ كما يلي : $f(x) = \frac{3x-1}{2x}$ تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس (i, j, o)، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها ، ماذا تستنتج ؟

نعتبر (U_n) المتتالية العددية المعرفة على N كما يلي :

$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

(1) مثل دون حساب على محور الفواصل الحدود U_0, U_1, U_2 و U_3 مب冤را خطوط الرسم (على الوثيقة المرفق 1) (2) خمن اتجاه تغير المتتالية (U_n) و تقاربها.

(3) أ) برهن بالترابع انه من أجل كل عدد طبيعي n من N فان : $U_n > 1$.
ب) اثبت أن (U_n) متقاربة نحو نهاية يطلب تعبيئها.

(4) (V_n) متتالية عددية معرفة على N كما يلي :

$$V_n = \frac{U_n - 1}{2U_n - 1}$$

أ) بين أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعبيئ أساسها و حدها الاول.

ب) استنتاج عبارة U_n بدلالة n ثم نهاية المتتالية (U_n)

ج) احسب المجموع :

$$s = \frac{V_0 - 1}{U_0} + \frac{V_1 - 1}{U_1} + \frac{V_2 - 1}{U_2} + \dots + \frac{V_n - 1}{U_n}$$

التمرين الرابع (07 ن) :

g دالة معرفة على \mathbb{R} بـ : $g(x) = -1 + \ln(e^{2x} - e^x + 1)$ و (c_g) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس (i, j, o).

(1) احسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها و استنتاج مستقيم مقارب للمنحنى (c_g) .

(2) احسب عبارة الدالة المشتقة $(x)' g$ ، ثم ادرس إشارتها.

(3) ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(4) أ) برهن انه من أجل كل x من \mathbb{R} :

$$g(x) = 2x - 1 + \ln(1 - e^{-x} + e^{-2x})$$


ب) استنتاج أن (c_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا يطلب كتابة معادلة له.

ج) ادرس وضعية المنحنى (c_g) بالنسبة الى المستقيم $y = 2x - 1$: (Δ) .

(5) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (c_g) عند النقطة التي فاصلتها $x_0 = 0$.

(6) أنشئ المماس (T) ، المستقيمين المقاربين و المنحنى (c_g) . (على الوثيقة المرفقة 2)

(7) نقاش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة : $g(x) = mx - 1$.



الوثيقة المرفقة رقم 2

